

## EN CASO DE PEDICULOSIS...

En beneficio de todos rogamos :

- Se informe inmediatamente al Centro
- Se aplique el tratamiento que se detalla a continuación
- Para evitar contagios, es aconsejable que los alumnos permanezcan en casa hasta que los parásitos estén **totalmente erradicados**.



## TRATAMIENTO

1. Solicite a su farmacéutico una LOCIÓN ANTIPARASITARIA, preferible A BASE DE PIRETINAS.
2. Mojar todo el cabello y cuero cabelludo con la LOCIÓN PEDICULICIDA. No lavar el cabello antes de aplicar la loción.
3. Pasadas 2 a 4 horas lavar el cabello con champú normal o pediculicida.
4. Aclarar con agua y vinagre (una parte de vinagre y dos de agua), para favorecer la eliminación de las liendres:
5. No secar el pelo con secador.
6. Una vez aclarado el pelo, quitar las liendres a mano (es lo más eficaz) o con una lendrera (peine de púas muy juntas).
7. EL TRATAMIENTO DEBE REPETIRSE A LOS 10 Y 20 DÍAS.
8. Los peines, adornos del pelo, etc,... se deben sumergir una hora en loción pediculicida. La ropa, sábanas y toallas se deben lavar con agua caliente.
9. Se deben revisar a todos los que conviven con el niño parasitado para poner tratamiento siempre que se detecten liendres o piojos.

## RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA PEDICULOSIS



- ✓ Lavar con frecuencia el pelo (al menos una vez por semana )
- ✓ Peinar y cepillar diariamente el pelo
- ✓ Revisar frecuentemente la cabeza de los niños (sobre todo detrás de las orejas y en la nuca).
- ✓ Limpiar peines y cepillos con frecuencia.
- ✓ No intercambiar útiles como peines, gomas, gorros, etc..

## ¿LO SABÍA ?



Desde hace unos años, se observa un aumento de la PEDICULOSIS (PIOJOS) en el hombre.

Los piojos se encuentran ampliamente distribuidos en todas las clases sociales y, por tanto, **no han de constituir motivo de complejo, sino simplemente admitir que constituyen un problema sanitario.**

El piojo se alimenta chupando la sangre del cuero cabelludo, las hembras ponen huevos (LIENDRES), que sujetan a un pelo con **pegamento difícil de disolver**; la liendre es una formación blanca, ovalada, que se distingue de la caspa porque está muy sujeta al pelo. De estos huevos, **al cabo de 7 a 15 días vuelve a salir un nuevo piojo** que pronto se hará adulto y comenzará a picar y poner más huevos.

